

## Posologia

Matricaria Camomilla L. + Glycyrrhiza Glabra L. + Ácido Ascórbio (Vitamina C) + Colecalciferol (Vitamina D3) é indicada somente para o uso bucal para crianças na fase de primeira dentição.

Posologia do Matricaria Camomilla L. + Glycyrrhiza Glabra L. + Ácido Ascórbio (Vitamina C) + Colecalciferol (Vitamina D3)  
Administrar 1 cápsula a cada aplicação, duas vezes ao dia ou a critério médico.

A cápsula não deve ser ingerida. Ela deve ser aberta cuidadosamente e o seu conteúdo deve ser administrado diretamente na área afetada da gengiva.

Massagens no local podem ser realizadas para facilitar a aplicação, com o auxílio dos dedos previamente limpos.

A dose máxima diária de Matricaria Camomilla L. + Glycyrrhiza Glabra L. + Ácido Ascórbio (Vitamina C) + Colecalciferol (Vitamina D3) é de 4 cápsulas.

A duração do tratamento será até a primeira dentição completa do bebê.

Se uma dose de Matricaria Camomilla L. + Glycyrrhiza Glabra L. + Ácido Ascórbio (Vitamina C) + Colecalciferol (Vitamina D3) for esquecida, esperar até o horário de ministrar a próxima dose.

Posicione a cápsula de modo que a parte azul tampa fique para cima.

Gire a tampa de forma a abrir a cápsula

Aplique no local afetado com o auxílio do dedo previamente limpo.

## Indicações do produto

Matricaria Camomilla L. + Glycyrrhiza Glabra L. + Ácido Ascórbio (Vitamina C) + Colecalciferol (Vitamina D3) é indicada como medicamento auxiliar para o alívio dos sinais e sintomas associados com a primeira dentição.

## Contra Indicações

Matricaria Camomilla L. + Glycyrrhiza Glabra L. + Ácido Ascórbio (Vitamina C) + Colecalciferol (Vitamina D3) está contraindicada nos casos de hipersensibilidade a um ou mais componentes da fórmula.

Este produto está contraindicado em caso de hipersensibilidade a espécies vegetais da família Asteraceae. Crianças que apresentam febre, irritação intensa, alterações gengivais importantes e problemas digestivos durante o processo da primeira dentição devem procurar um médico, pois estes sintomas podem estar relacionados a algum processo infeccioso/inflamatório que não seja a dentição.

Também é contraindicado na hipercalcemia, hipercalciúria, cálculo renal, hiperparatireoidismo primário, superdosagem prévia de vitamina D, mieloma e metástase óssea.

## Efeitos Colaterais

Muito raras (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento)  
Raríssimos efeitos adversos foram relatados com o uso correto do medicamento.

Muito raramente podem ocorrer vômitos, constipação intestinal, diarreia e hipersensibilidade.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em [www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm](http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm) ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

## DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM