

**Posologia**

Uso oral.

Dose usual em adultos e adolescentes

Profilaxia e tratamento da cinetose

25 a 50 mg, 1 hora antes de viajar. A dose pode ser repetida a cada 24 horas, se necessário.

Profilaxia e tratamento das vertigens associadas às doenças que afetam o sistema vestibular

25 a 100 mg por dia, conforme necessário, em doses divididas.

Profilaxia e tratamento de náuseas e vômitos induzidos por radioterapia

50 mg, de 2 a 12 horas antes da radioterapia.

Tratamento de náuseas e vômitos durante a gravidez

25 a 100 mg por dia, conforme necessário, em doses divididas.

Os comprimidos de Meclozina 25 mg não devem ser mastigados.

Os comprimidos de Meclozina 50 mg não devem ser partidos ou mastigados.

**Indicações do produto**

Meclozina é indicado para:

Profilaxia e tratamento da cinetose;

Profilaxia e tratamento das vertigens associadas às doenças que afetam o sistema vestibular, como as labirintites e a Doença de Menière;

Profilaxia e tratamento de náuseas e vômitos induzidos por radioterapia;

Tratamento de náuseas e vômitos durante a gravidez.

**Contra Indicações**

Nos casos de hipersensibilidade a Meclozina ou aos constituintes da formulação do produto.

Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 anos.

**Efeitos Colaterais**

As reações adversas a Meclozina são apresentadas a seguir, em ordem decrescente de frequência.

Reação comum (> 1% e < 10%)

Sonolência.

Reações incomuns (> 0,1% e < 1%)

Xerostomia, ressecamento de nariz e garganta, cefaleia, fadiga, embaçamento visual e reação anafilactoide.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos – Vigimed, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

**DCB-Denominação Comum Brasileira**

NAO TEM