

Posologia

Agitar o frasco antes de usar.

Adultos

Administrar 5 mL (equivalente a ½ copo dosador), via oral, três vezes ao dia, de 8 em 8 horas.

Crianças acima de 5 anos

Administrar 2,5 mL (equivalente a ¼ do copo dosador), via oral, três vezes ao dia, de 8 em 8 horas.

Crianças de 2 a 5 anos

Administrar 2,5 mL (equivalente a ¼ do copo dosador), via oral, duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas.

Em casos de afecções respiratórias agudas, recomenda-se o uso por 7 dias e, em casos crônicos, por 2 semanas.

A dose diária não deve ultrapassar a 16 mL ao dia.

Indicações do produto

expectoração e rouquidão.

Contra Indicações

Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

Gravidez

Categoria C de risco na gravidez: "Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas".

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Efeitos Colaterais

Pode ocorrer hipotensão. Em raras ocasiões, pessoas hipersensíveis aos componentes do xarope podem apresentar um agravamento da dispnéia e da tosse.

Em casos eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM