

Posologia

desejado.

Após aplicação de Mupirocina, lavar as mãos.

Ao fim do tratamento, deve-se descartar o que restou do produto.

Posologia do Mupirocina

Crianças e adultos: Mupirocina deve ser aplicado na área afetada até três vezes ao dia e por no máximo dez dias, dependendo da resposta.

Indicações do produto

Mupirocina pomada é indicado para o tratamento de infecções bacterianas de pele como impetigo, foliculite e furunculose.

Contra Indicações

contenham esse mesmo componente.

Não existem contraindicações relativas a faixas etárias.

Efeitos Colaterais

As reações adversas são classificadas abaixo, de acordo com sua frequência, como muito comuns ($>1/10$), comuns ($>1/100$ e $<1/10$), incomuns ($>1/1.000$ e $<1/100$), raras ($>1/10.000$ e $<1/1.000$) ou muito raras ($<1/10.000$), incluindo casos isolados.

As reações adversas comuns e incomuns foram determinadas com base em um conjunto de dados de segurança de 12 estudos clínicos que envolveram uma população total de 1.573 pacientes. Para estabelecer as reações adversas raras utilizaram-se dados pós-comercialização; portanto, elas estão relacionadas à frequência de casos reportados, e não à frequência real observada na população.

Reação comum ($>1/100$ e $<1/10$)

Ardência localizada na área da aplicação

Reações incomuns ($>1/1.000$ e $<1/100$)

Prurido, eritema, parestesias e ressecamento da área da aplicação; reações de sensibilização cutânea à mupirocina ou à base da pomada

Reações muito raras ($>1/10.000$)

Reações alérgicas sistêmicas incluindo anafilaxia, rash generalizado, urticária e angioedema foram relatados com Mupirocina.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

06150.