

Posologia

Uso vaginal.

Creme Vaginal**Instruções de uso**

Os aplicadores descartáveis que acompanham o produto são usados para introduzir, profundamente, o creme na vagina. Recomenda-se que a paciente esteja deitada. A aplicação deve ser realizada preferencialmente à noite, antes de dormir. O tratamento não deve ser realizado durante o período menstrual. A paciente deve ser informada que o aplicador deve ser utilizado com cautela no caso de gestação.

Uso do aplicador descartável

Remova a tampa da bisnaga e encaixe o aplicador na bisnaga.

Puxe o êmbolo do aplicador.

Aperte suavemente a bisnaga para encher o aplicador com o creme.

Remova o aplicador da bisnaga e tampe-a.

Introduza o aplicador profundamente na vagina e esvazie-o pressionando o êmbolo.

Tratamento de 7 dias

Introduzir uma dose diária de Nitrato de Isoconazol durante 7 dias consecutivos, profundamente na vagina, com auxílio do aplicador.

Óvulo**Instruções de uso**

Recomenda-se que a paciente esteja deitada. A aplicação deve ser realizada preferencialmente à noite, antes de dormir. As dedeiras que acompanham o produto devem ser usadas para ajudar na aplicação. O tratamento não deve ser realizado durante o período menstrual.

Tratamento de 1 dia

O tratamento é de dose única. Nitrato de Isoconazol óvulo deve ser introduzido profundamente na vagina, com auxílio das dedeiras que acompanham o produto.

Indicações do produto

Nitrato de Isoconazol é indicado para o tratamento de infecções fúngicas da vagina.

Contra Indicações

Nitrato de Isoconazol é contraindicado no caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

Efeitos Colaterais

de Nitrato de Isoconazol incluíram: irritação, ardor e prurido no local da aplicação. Lista tabulada de reações adversas A frequência das reações adversas observadas nos estudos clínicos e citadas na tabela a seguir são definidas de acordo com a convenção de frequência MedDRA: Comum ($\geq 1/100$ a $< 1/10$); Incomum ($\geq 1/1.000$ a $< 1/100$); Raro ($\geq 1/10.000$ a $< 1/1.000$); Frequência desconhecida (a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis). As reações adversas identificadas apenas durante a pós-comercialização, e para as quais a frequência não pode ser estimada, estão descritas na lista abaixo como "frequência desconhecida". Classificação por Sistema Corpóreo Frequência de eventos relatados e observados nos estudos clínicos Nitrato de Isoconazol creme para indicações vaginais Identificado durante a pós-comercialização de Nitrato de Isoconazol para indicações vaginais Comum Incomum Rara Frequência desconhecida Distúrbios gastrointestinais - Náuseas - Distúrbios gerais e reações no local da administração Ardor no local da aplicação, prurido no local da aplicação e irritação no local da aplicação - Eczema no local da aplicação Vesículas no local da aplicação Distúrbios no sistema nervoso - Tontura cefaleia - Distúrbios no sistema reprodutivo e mamas - Corrimento vaginal - Dor vulvovaginal, inchaço vulvovaginal e eritema vulvovaginal Distúrbios no sistema imune - Hipersensibilidade no local da aplicação Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - Notivisa, disponível em www.anvisa.gov.br, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

05076.