

Posologia

Nitrato de Oxiconazol deve ser aplicado entre os dedos dos pés ou sobre o couro cabeludo.

Posologia

A aplicação deste medicamento deve ser feita de preferência à noite, uma vez ao dia ou a critério do médico. A duração do tratamento depende do caso, mas geralmente não deve ser inferior a três semanas. Após a completa recuperação da pele, o tratamento deve ser mantido por uma ou duas semanas para prevenir a recorrência.

Indicações do produto

Nitrato de Oxiconazol é indicado no tratamento de:

Todas as infecções cutâneas causadas por dermatófilos (Trichophyton, Epidermophyton e Microsporum);

Leveduras (especialmente Candida albicans);

Fungos leveduriformes (Malassezia furfur, patógeno envolvido na pitíriase versicolor);

Infecções mistas, por fungos e bactérias Gram-positivas;

Doenças causadas por fungos que atingem as extremidades (como a Tinea pedis), tronco, couro cabeludo e área genital externa (vulvite concomitante, inclusive no tratamento profilático do parceiro);

Micoses que afetam as dobras cutâneas.

Contra Indicações

Pacientes que apresentem hipersensibilidade ao Nitrato de Oxiconazol ou a qualquer outro componente da fórmula.

Em pacientes idosos não há restrições específicas para o uso deste medicamento.

Efeitos Colaterais

ardência ou prurido.

Em caso de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA ou para a Vigilância

DCB-Denominação Comum Brasileira

06723.