

Posologia

No tratamento da prisão de ventre, 15 ml (1 colher de sopa) à noite e outra dosagem no dia seguinte ao despertar.

Caso não obtenha êxito, aumente a dosagem para 30 ml (2 colheres de sopa) à noite e 15 ml pela manhã.

Crianças maiores de 6 anos
(1-2ml) por kg de peso a noite ou pela manhã).

Administração a crianças menores de 6 anos, consulte o seu médico.

Indicações do produto

Laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera.

Contra Indicações

gastroesofágico e em pacientes acamados.

Esse medicamento é contraindicado para crianças menores de 6 anos.

Efeitos Colaterais

Efeitos metabólicos, redução do nível sérico de betacaroteno, efeito gastrintestinais. Dosagem oral excessiva pode resultar em incontinência e prurido anal.

Efeitos respiratórios

Atenção: O uso oral de óleo mineral aumenta o risco de desenvolvimento de pneumonia lipóidica.

Pacientes com disfagia, desordens neuromusculares que afetam a deglutição e o reflexo do vômito, além de alterações estruturais da faringe e esôfago apresentam risco aumentado de desenvolvimento de pneumonia lipóidica.

Esta predisposição é potencializada em neonatos e idosos.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM