

Posologia

Criança até 12 anos:

Usar de acordo com a tabela abaixo:

Idade Peso mL/dose

2 anos 12Kg 9,0mL

3 anos 14Kg 10,5mL

4 anos 16Kg 12,0mL

5 anos 18Kg 13,5mL

6 anos 20Kg 15,0mL

7 anos 22Kg 16,5mL

8 anos 24Kg 18,0mL

9 anos 26Kg 19,5mL

10 anos 28Kg 21,0mL

11 anos 30Kg 22,5mL

Administrar a dose indicada a cada 6 horas. Não exceder 4 doses em 24 horas.

Adultos e crianças acima de 12 anos

1 copo dosador (30mL) a cada 6 horas. Não exceder 4 doses em 24 horas.

Não deve ser administrado a crianças menores de 2 anos.

Uso oral.

Uso adulto e pediátrico acima de 2 anos.

Indicações do produto

Paracetamol + Fenilefrina + Maleato de Carbinoxamina (substâncias ativas) é indicado como analgésico e antitérmico, e ainda nos processos que envolvem as vias aéreas superiores, como descongestionante nasal.

Contra Indicações

Contraindicações

Em caso de alergia a algum dos componentes da fórmula, a administração do produto deve ser descontinuada. Nos 3 primeiros meses de gravidez e após este período deverá ser administrado apenas em caso de necessidade, sob controle médico. É contraindicado a pacientes com glaucoma de ângulo estreito.

Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos.

Efeitos Colaterais

Reações adversas leves:

Raramente se observam reações de hipersensibilidade, mas se isto ocorrer deve-se interromper a administração da droga. Também foram mencionados outros efeitos adversos como náusea, vômito, dor abdominal, hipotemia, palpitação, palidez. Sob o uso prolongado podem surgir discrasias sanguíneas. A literatura a respeito do paracetamol relata casos de trombocitopenia, pancitopenia, agranulocitose, anemia hemolítica e metahemoglobina, já tendo sido relatados casos de aplasia medular.

O uso prolongado pode causar necrose papilar renal. Reações cutâneas têm sido relatadas e incluem principalmente eritema e urticária. Dependendo da sensibilidade individual do paciente. Leve sonolência poderá ocorrer após a 1ª dose; por este motivo recomenda-se aos pacientes especial cuidado ao executarem trabalhos mecânicos que requeiram atenção até que sua reação seja determinada. Podem ocorrer também nervosismo e tremores devido à fenilefrina.

Em casos de eventos adversos, notifique ao sistema de Notificação em Vigilância Sanitária NOTIVISA, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem