

Posologia

A cápsula deve ser ingerida inteira, com um copo cheio de água.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Posologia Persea americana Mill. + Glycine max (L.) Merr.

1 cápsula de Persea americana Mill. + Glycine max (L.) Merr. ao dia, durante a refeição.

O tratamento deve perdurar por 3 a 6 meses, ou a critério médico, nos casos de osteoartrites.

Indicações do produto

de osteoartrite.

Contra Indicações

Este medicamento é contraindicado a pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula presentes e com alergia a amendoim.

Efeitos Colaterais

Experiência pós-comercialização

Reações comuns (> 1/100 pacientes < 1/10):

Desordens gastrointestinais: náuseas, dor abdominal e diarreia.

Reações muito raras (< 1/10.000 pacientes – 0,01%):

Desordens gastrointestinais: regurgitação com odor lipídico (que pode ser evitada com a ingestão da cápsula durante a refeição);
Desordens hepatobiliares: aumento das transaminases, da fosfatase alcalina, da bilirrubina e da gama glutamiltranspeptidase, hepatite, dano hepatocelular, icterícia e colestase;

Desordens do sistema imune: reações de hipersensibilidade como prurido, erupção cutânea, eritema e urticária.

Em casos de eventos adversos, notifique à empresa e ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem