

### Posologia

Dependendo da conveniência e rotina diária, pode ser administrado em horários alternativos, tendo em mente que seu efeito ocorre em aproximadamente 6 a 12 horas após a administração.

É recomendado iniciar o uso com a menor dose e ajustar até a dose máxima recomendada para produzir evacuações regulares.

A dose diária máxima recomendada não deve ser excedida.

Picossulfato de Sódio solução

Recomenda-se a seguinte dose de Picossulfato de Sódio, a não ser que o médico prescreva dose diferente:

Adultos

10 a 20 gotas da solução oral (5-10 mg) por dia.

População pediátrica

Crianças acima de 10 anos de idade

10 a 20 gotas da solução oral (5-10 mg) por dia.

Crianças de 4 a 10 anos de idade

5 a 10 gotas da solução oral (2,5-5 mg) por dia.

Para crianças menores de 4 anos

A dose recomendada é de 0,25 mg por quilograma de peso corpóreo por dia (1 gota de Picossulfato de Sódio solução contém 0,5 mg de picossulfato de sódio).

Picossulfato de Sódio vem acondicionado em um frasco provido de um moderno gotejador que é fácil de usar:

Rompa o lacre da tampa;

Vire o frasco em posição vertical, com o gotejador para baixo;

Para começar o gotejamento, bater levemente com o dedo no fundo do frasco e deixar gotejar a quantidade desejada.

Picossulfato de Sódio pérolas

Picossulfato de Sódio pérolas deve ser administrado com água suficiente.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Recomenda-se a seguinte dose de Picossulfato de Sódio, a não ser que o médico prescreva dose diferente:

### Indicações do produto

facilitada.

### Contra Indicações

Pacientes com íleo paralítico ou com obstrução intestinal;

Pacientes com dor severa e/ou com quadros abdominais agudos febris (por exemplo, apendicite) potencialmente associados com episódios de náuseas e vômitos;

Pacientes com doenças inflamatórias agudas do intestino;

Desidratação grave;

Pacientes com conhecida hipersensibilidade ao picossulfato de sódio ou a qualquer outro componente da fórmula;

Em casos de condição hereditária rara de intolerância à frutose devido à presença de sorbitol em sua formulação.

### Efeitos Colaterais

Reação muito comum ( $> 1/10$ )

Diarreia.

Reação comum ( $> 1/100$  e  $< 1/10$ )

Cólicas abdominais;

Dor abdominal;

Desconforto abdominal.

Reação incomum ( $> 1/1.000$  e  $< 1/100$ )

Tontura;

Vômitos;

Náuseas.

Reações com frequência desconhecida (não foi possível calcular a frequência com base nos dados disponíveis)

Hipersensibilidade;

Reações cutâneas (como angioedema, erupções, rash cutâneo e prurido);

Síncope.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária NOTIVISA, disponível em [www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm](http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm), ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

#### **DCB-Denominação Comum Brasileira**

07035.