

Posologia

Via oral.

Os comprimidos devem ser ingeridos sem mastigar, com líquido suficiente para engolir.

Etilismo agudo

1 a 4 comprimidos ao dia a critério do médico.

Etilismo crônico

2 a 3 comprimidos ao dia com duração mínima de 30 a 90 dias ou enquanto permanecer a ingestão excessiva de álcool ou a critério do médico.

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

Indicações do produto

Este medicamento é destinado ao tratamento das alterações do fígado, decorrentes da ingestão excessiva de bebida alcoólica, em particular fígado gorduroso e hepatite alcoólica.

Também é apropriado para completar protocolos terapêuticos referentes ao "desmame" inicial e manutenção na abstinência de indivíduos alcoólicos.

Contra Indicações

componente da formulação.

Efeitos Colaterais

Não foram relatadas reações adversas específicas com o pidolato de piridoxina.

Porém, reações adversas específicas podem ocorrer ocasionalmente, como com qualquer outro medicamento. Os mais comuns são: transtorno gástrico e erupção cutânea.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www8.anvisa.gov.br/notivisa/fmCadastro.asp, ou a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem