

Posologia

Polissulfato de Mucopolissacarídeo é um medicamento de uso tópico/uso externo.

Aplicar uma camada de Polissulfato de Mucopolissacarídeo sobre toda a extensão da região afetada, espalhando suavemente três a quatro vezes ao dia ou mais, de acordo com o caso clínico.

Após o uso, mantenha a bisnaga bem fechada para evitar contaminação do produto.

No caso de úlceras ou inflamações extremamente dolorosas, especialmente nos membros inferiores, compressas com gaze podem ser utilizadas.

Para a prevenção de flebites pós-infusão e pós-venóclise, recomenda-se aplicar Polissulfato de Mucopolissacarídeo imediatamente após a punção da cânula/agulha.

Polissulfato de Mucopolissacarídeo é especialmente adequado para tratamentos físicos como fonoforese e iontoforese. Neste último caso, deve ser aplicado debaixo do cátodo.

Polissulfato de Mucopolissacarídeo deverá ser aplicado até o desaparecimento dos sintomas.

Geralmente a duração do tratamento em casos de lesões é de dez dias e, no caso de inflamação das veias, de uma a duas semanas.

É esperado que ocorra melhora dos sintomas após catorze dias de tratamento contínuo e que os sintomas não voltem após o término do tratamento.

Indicações do produto

Polissulfato de Mucopolissacarídeo é indicado nos quadros clínicos e processos em que é necessária uma ação anti-inflamatória, antiexsudativa, anticoagulante, antitrombótica, fibrinolítica e se deseja a regeneração do tecido conjuntivo, especialmente dos membros inferiores. Nos processos inflamatórios localizados, varizes, flebites pós-infusão e pós-venóclise, tromboflebites superficiais, linfangites, linfadenites, hematomas, furúnculos e mastite.

Polissulfato de Mucopolissacarídeo é especialmente apropriado para o alívio dos casos nos quais a presença de edema leva à

Contra Indicações

Não se recomenda o uso de Polissulfato de Mucopolissacarídeo quando já ocorreu alguma reação de hipersensibilidade relacionada ao Polissulfato de Mucopolissacarídeo ou a qualquer um dos componentes do medicamento.

Efeitos Colaterais

Em alguns casos a aplicação de Polissulfato de Mucopolissacarídeo poderá causar reações de hipersensibilidade como vermelhidão na pele, porém, geralmente, estes sintomas desaparecem com a interrupção do uso do medicamento.

Avaliou-se o potencial de irritabilidade, sensibilização, fototoxicidade e de fotoalergia cutânea do Polissulfato de Mucopolissacarídeo. No estudo com Polissulfato de Mucopolissacarídeo que foi realizado com 122 pacientes, somente um paciente apresentou uma discreta reação de irritabilidade cutânea após aplicações repetidas.

Foram relatados alguns casos isolados de dermatite de contato após o uso de Polissulfato de Mucopolissacarídeo, mas os sinais regrediram em alguns dias após a suspensão do uso do medicamento.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem