

Posologia

Via parenteral.

Adultos

No geral aplicar 1 ampola duas vezes por semana, por via subcutânea (inclusive periarticular), intramuscular, intracutânea, intravenoso.

Como abrir a ampola:

Ponto colorido para cima!

Fazer o líquido eventualmente contido na parte superior da ampola passar para a parte inferior por meio de movimentos circulares ou pequenos golpes de dedo.

Ponto colorido para cima!

Segurando firmemente o corpo da ampola numa mão, aplicar com a outra uma força sobre a parte superior, em direção contrária ao ponto (ou seja, para baixo), até o rompimento do gargalo da ampola.

Indicações do produto

periartrite escapulo-humeral.

Contra Indicações

Este medicamento é contra-indicado aos pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Efeitos Colaterais

Em alguns casos, podem aparecer alterações no fígado como

Aumento de enzimas (transaminases) e de bilirrubina. Em casos individuais, podem ocorrer icterícia e hepatite.

Nestes casos, interrompa o tratamento e entre em contato com o seu médico. Em casos muito raros, sintomas gastrointestinais, ou reações de pele podem aparecer depois de algum tempo após ter usado o medicamento.

O médico deve informar ao paciente para entrar em contato, caso os sintomas persistam por mais de 2 dias, ou se agravem. No caso do tratamento ser longo, acompanhar a evolução do paciente durante todo o período do tratamento

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM