

Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado

Posologia

Nas alterações agudas da flora intestinal e na diarreia por *Clostridium difficile*:
2 cápsulas, duas vezes ao dia.

Nas alterações crônicas da flora intestinal:
1 cápsula, duas vezes ao dia.

Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado 200 mg cápsula
Nas alterações agudas da flora intestinal e na diarreia por *Clostridium difficile*:
1 cápsula, duas vezes ao dia.

Nas alterações crônicas da flora intestinal:
1 cápsula, uma vez ao dia.

As cápsulas devem ser ingeridas inteiras, sem mastigar, com um pouco de líquido. Em caso de necessidade (crianças ou pacientes com dificuldades de engolir), recomenda-se abrir as cápsulas e misturar seu conteúdo a mamadeiras, pequenas quantidades de líquidos ou alimentos semissólidos. Não adicionar o produto a líquidos ou alimentos quentes (acima de 60°C) ou gelados, assim como a bebidas alcoólicas.

Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado 200 mg envelope
Nas alterações agudas da flora intestinal e na diarreia por *Clostridium difficile*:
1 envelope, duas vezes ao dia.

Nas alterações crônicas da flora intestinal:
1 envelope, uma vez ao dia.

O conteúdo do envelope deve ser dissolvido em 100 mL (um copo) de água, agitar até a total homogeneização. Beber imediatamente após o preparo. Para crianças pequenas, recomenda-se adicionar o conteúdo do envelope à mamadeiras, pequenas quantidades de líquidos, alimentos semissólidos ou diretamente na boca. Não adicionar o produto a líquidos ou alimentos quentes (temperatura acima de 60°C) ou gelados, assim como a bebidas alcoólicas.

Tanto as cápsulas, quanto o conteúdo dos envelopes devem ser administrados em jejum ou meia hora antes das refeições. No caso de pacientes sob tratamento com antibióticos e quimioterápicos, administrar *Saccharomyces boulardii* - 17 liofilizado um pouco antes desses medicamentos. Após a abertura das cápsulas ou envelopes, *Saccharomyces boulardii* - 17 liofilizado deve ser imediatamente ingerido, pois o contato com o ar e a umidade alteram o prazo de validade do produto.

A posologia de *Saccharomyces boulardii* - 17 liofilizado pode ser alterada a critério médico. Na maioria dos casos, são suficientes

Indicações do produto

Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado é destinado ao tratamento, como adjuvante, da diarreia produzida por *Clostridium difficile*, por antibioticoterapia ou quimioterapia e na restauração da flora intestinal fisiológica.

Contra Indicações

Não são conhecidas, até o momento, condições que contraindiquem o uso de *Saccharomyces boulardii* - 17 liofilizado, excetuando eventuais hipersensibilidades aos excipientes.

Atenção diabéticos: contém açúcar. (*Saccharomyces boulardii* - 17 liofilizado 200mg pó).

Este medicamento contém lactose e portanto pode conter traços de outros compostos derivados do leite.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Efeitos Colaterais

Não são conhecidos, até o presente, relatos de reações desagradáveis decorrentes do uso de *Saccharomyces boulardii* - 17 liofilizado. Em algumas crianças ou lactentes, pode-se observar cheiro de fermento nas fezes, sem qualquer significado nocivo.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM