

### Posologia

Lave e seque a área afetada. Segure nas extremidades e puxe em sentido contrário. Retire o filme plástico que se desprenderá do Salicilato de Etilenoglicol + Acetato de Tocoferol + Mentol + Cânfora e aplique na área afetada.

Utilize de 1 a 2 vezes ao dia, evitando deixar cada emplastro por mais de 8 horas.

Recomenda-se o uso de bandagem ou adesivos para manter o produto aderido à pele.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

### Indicações do produto

Este medicamento é indicado para alívio de dores e inflamações nas condições de tensão muscular, dores musculares e lombares, rigidez nos ombros, contusões, pancadas, torções, entorses, torcicolo, dores nas costas, neuralgia e dores articulares.

Salicilato de Etilenoglicol + Acetato de Tocoferol + Mentol + Cânfora também pode ser utilizado para tratar outras condições determinadas por um médico.

### Contra Indicações

Salicilato de Etilenoglicol + Acetato de Tocoferol + Mentol + Cânfora é contraindicado para pacientes que já apresentaram alguma reação alérgica ao ácido acetilsalicílico, a outros anti-inflamatórios não esteroidais ou já tenham demonstrado hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 02 anos de idade.

### Efeitos Colaterais

As reações já relatadas e frequentes quanto ao uso de Salicilato de Etilenoglicol + Acetato de Tocoferol + Mentol + Cânfora são irritação local, prurido (coceira), eritema (vermelhidão), erupção, lesão bolhosa, descamação, manchas, reações no local da aplicação, eczema (inflamação da pele que pode apresentar vermelhidão, inchaço, bolhas, crostas, descamação, coceira e ardência).

Caso apresente alguns destes sintomas ou outros efeitos indesejáveis não mencionados, pare de usar, lave bem o local da aplicação com água corrente e procure um médico imediatamente.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

### DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM