

Posologia

Simeticona deve ser administrado por via oral.

Não há estudos dos efeitos de Simeticona comprimidos e gotas administrado por vias não recomendadas.

Portanto, por segurança e para eficácia destas apresentações, a administração deve ser somente pela via oral.

As doses poderão ser aumentadas a critério médico.

Simeticona comprimidos

Tomar 1 comprimido 3 vezes ao dia, às refeições.

Atenção: o comprimido deve ser removido com cuidado.

Simeticona gotas (25 gotas/mL)

Crianças – lactentes

3 a 5 gotas, 3 vezes ao dia. Até 12 anos:

5 a 10 gotas, 3 vezes ao dia.

Acima de 12 anos e adultos

13 gotas, 3 vezes ao dia.

As gotas podem ser administradas diretamente na boca, ou diluídas em um pouco de água ou outro alimento.

A dose máxima diária de Simeticona deve ser limitada a 500 mg (12 comprimidos ou 166 gotas).

O frasco de Simeticona gotas deve ser agitado antes do uso.

Indicações do produto

Simeticona é indicada para o alívio dos sintomas no caso de excesso de gases no aparelho gastrointestinal constituindo motivo de dores ou cólicas intestinais¹, tais como:

Meteorismo¹;

Eructação¹;

Borboríngos¹;

Aerofagia pós-cirúrgica¹;

Distensão abdominal¹;

Flatulência¹.

Sabendo que os gases no trato digestivo atrapalham os exames abdominais de imagem e a Simeticona facilita a eliminação dos gases, Simeticona pode ser usado na preparação do paciente a ser submetido à endoscopia digestiva e/ ou colonoscopia.

ICID R14 – Flatulência e afecções correlatas (distensão abdominal (gasosa), dor de gases, eructação, hipertimpanismo (abdominal/intestinal) e meteorismo).

Contra Indicações

Simeticona é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Simeticona é contraindicado aos pacientes com perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida.

Efeitos Colaterais

A Simeticona não é absorvida pelo organismo. Ela atua somente dentro do aparelho digestivo, e é totalmente eliminada nas fezes, sem alterações.

Portanto, reações indesejáveis são menos prováveis de ocorrer:

Eczema de contato;

Em casos raros: reações imediatas como urticária.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações de Eventos Adversos a Medicamentos – VIGIMED, disponível em <https://clicktime.symantec.com/37v8AcPYAxtMf5Y4BYeVtfo6H2?u=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fvigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

08006.