

Posologia

Simeticona + Metilbrometo de Homatropina deve ser administrado somente por via oral e possui um sabor extremamente agradável garantindo pronta aceitação por parte dos lactentes e crianças.

Recomenda-se administrar o produto antes das refeições.

Agite bem antes de usar.

Crianças e lactentes

Uma gota/kg de peso a cada 8 horas.

Simeticona + Metilbrometo de Homatropina não deve ser administrado em altas doses ou por longo tempo, sem prescrição de um médico ou dentista.

Indicações do produto

gastrintestinal e flatulência.

Contra Indicações

Não deve utilizar Simeticona + Metilbrometo de Homatropina se estiver alergia ou sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Não use Simeticona + Metilbrometo de Homatropina se você apresentar algum dos sintomas:

Temperatura elevada ou de febre;

Síndrome de Down;

Glaucoma.

Efeitos Colaterais

A simeticona é um agente fisiologicamente inerte, e não está associada com nenhuma toxicidade conhecida.

Reações que podem ocorrer com o uso da homatropina (sem incidência definida):

Sistema nervoso central:

Agitação psicomotora; dor de cabeça; irritabilidade; nervosismo.

Dermatológico:

Rubor na pele.

Gastrintestinal:

Boca seca; constipação intestinal, náusea, vômito.

Oftálmico:

Dilatação das pupilas; aumento da pressão intraocular, ressecamento dos olhos; visão borrada.

Cardiovascular:

Aumento dos batimentos do coração; palpitação.

Urinário:

Retenção urinária.

Outros:

Diminuição da transpiração; dor musculoesquelética; perda do paladar; prostração pelo calor (em ambientes muito quentes) em lactentes; dificuldade respiratória; falta de ar; colapso respiratório.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM