

**Posologia**

Uso retal.

Para obter o máximo de eficácia, utilize Sorbitol + Laurilsulfato de Sódio no horário e dose exata estipulados pelo seu médico.

Corte a ponta da cânula, conforme demonstrado na ilustração.

Aplique por via retal, introduzindo suavemente a cânula e comprimindo a bisnaga até que todo o conteúdo da mesma tenha sido expelido.

Quando necessário poderão ser aplicadas duas doses simultaneamente, especialmente em casos de fecaloma.

A critério médico, as doses pediátricas podem ser individualizadas de acordo com a idade do paciente.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico.

Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

**Indicações do produto**

Sorbitol + Laurilsulfato de Sódio é um laxativo osmótico que promove o esvaziamento intestinal. É indicado em casos de constipação e pode ser utilizado no preparo para a realização de exames de cólon.

**Contra Indicações**

Sorbitol + Laurilsulfato de Sódio não deve ser utilizado em caso de sensibilidade (alergia) conhecida ao sorbitol, ao laurilsulfato de sódio ou a qualquer um dos componentes da fórmula.

Sorbitol + Laurilsulfato de Sódio não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Sorbitol + Laurilsulfato de Sódio é contraindicado para menores de 2 dias de vida.

**Efeitos Colaterais**

Sorbitol + Laurilsulfato de Sódio é muito bem tolerado, sendo relatados leves efeitos colaterais como dor abdominal e ardor anal.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento (SAC).

**DCB-Denominação Comum Brasileira**

NAO TEM