

Stryphnodendron Adstringens (Mart.) Coville

Posologia

O produto Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville é apresentado na forma de pomada de 60 mg/g.

O produto é de uso tópico.

Posologia do Stryphnodendron Adstringens (Mart.) Coville

Adulto

Realizar a aplicação da pomada de 2 a 3 vezes ao dia.

Indicações do produto

O Stryphnodendron Adstringens (Mart.) Coville está indicado como agente cicatrizante em vários tipos de lesões.

Contra Indicações

O produto Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville é contra-indicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

O produto Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville é contra-indicado em escaras em estágio III e IV: Necrose de tecido com comprometimento de ossos ou estruturas de suporte (tendão, cápsulas, etc.) segundo a classificação do Quick Reference Guide for Clinicians. Hipótese de osteomielite, artrite séptica ou celulite avançada.

Em feridas com indicação de debridamento com a presença de septicemia, febre sem foco evidente, taquicardia, deterioração do estado mental, endocardite bacteriana em atividade.

Estado geral muito comprometido como desnutrição grau IV, caquexia, crises de hipotensão, paciente acamado durante longos períodos.

Efeitos Colaterais

Não foram relatadas quaisquer reações adversas ao uso estabelecido do produto.

Pacientes com transtornos na tireóide devem consultar um especialista antes de fazer uso deste medicamento.

Atenção: Este produto é um novo medicamento e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, podem ocorrer efeitos indesejáveis não conhecidos. Se isto ocorrer, o médico responsável deve ser comunicado.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM