

Subgalato de Bismuto + Óxido de Zinco

Posologia

Uso Externo.

Prevenção e combate a assaduras

Sobre a pele limpa e seca, aplicar Subgalato de Bismuto + Óxido de Zinco diretamente nas partes afetadas. Espalhar o medicamento fazendo movimentos circulares até a obtenção de uma camada fina sobre a pele, protegendo-a contra o contato da urina e das fezes.

Utilizar após o banho, após cada troca de fralda ou a critério médico.

Demais indicações

Sobre a pele limpa e seca, aplicar Subgalato de Bismuto + Óxido de Zinco diretamente nas partes afetadas. Espalhar o medicamento fazendo movimentos circulares até a sua completa uniformização. Utilizar de 3 a 5 vezes ao dia. Manter o tratamento até o desaparecimento dos sintomas, ou a critério de seu médico.

Indicações do produto

causadas pelo uso de fraldas e também eritemas provocados por assaduras e brotoejas. Possui ação emoliente, umectante e hidratante, deixando a pele macia e perfumada. O uso diário de Subgalato de Bismuto + Óxido de Zinco ajuda a proteger a pele da ação do vento e proporciona sensação de frescor após exposição prolongada ao sol.

Contra Indicações

um dos componentes da fórmula. Não deve ser utilizado em ferimentos ou lesões graves como cortes profundos, ulcerações dermatológicas ou queimaduras de 2º e 3º graus.

Efeitos Colaterais

Pacientes sensíveis a algum componente da fórmula podem apresentar reações de hipersensibilidade local, características dos produtos de aplicação tópica. Caso ocorra algum tipo de irritação, o uso de Subgalato de Bismuto + Óxido de Zinco deverá ser interrompido imediatamente.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM