

### Posologia

A posologia recomendada é de 2 a 3 comprimidos revestidos ao dia. Os comprimidos revestidos devem ser ingeridos com copo de água juntamente com o café da manhã e o almoço.

A duração do tratamento é de 4 semanas ou de acordo com o critério médico, sendo recomendado período máximo de tratamento de 6 meses.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### Indicações do produto

Sulbutiamina é indicado no tratamento das astenias físicas, psíquicas e intelectuais e na reabilitação de pacientes coronarianos. Em casos confirmados de depressão, este medicamento não elimina a necessidade de um tratamento antidepressivo específico.

### Contra Indicações

Sulbutiamina não deve ser utilizado nos casos de hipersensibilidade a sulbutiamina ou a qualquer componente da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para uso por crianças.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

### Efeitos Colaterais

(>1/100 e ≤1/10);Incomuns (>1/1.000 e ≤1/100);Rara (>1/10.000 e ≤1/1.000);Muito rara (≤1/10.000);Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis).Classe de Sistema de ÓrgãosFrequênciaTermo preferidoAlterações psiquiátricasIncomumAgitaçãoAlterações do sistema nervosoIncomunsDor de cabeçaTremorAlterações GastrointestinaisIncomunsNáuseaVômitoDesconhecidosDor epigástricaDiarreiaAlterações de tecido cutâneo e subcutâneoIncomumErupção cutâneaAlterações gerais e alterações no local de administraçãoIncomumMal-estarDescrição de reações indesejadas selecionadasEm razão da presença do corante laca amarelo crepúsculo, há risco de reações alérgicas.Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - Notivisa, disponível em [www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm](http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm), ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

### DCB-Denominação Comum Brasileira

08097.