

Posologia

Tomar uma drágea por dia, ou uma drágea pela manhã e uma a noite com intervalo de 12 horas entre as tomadas, ou uma drágea com intervalo de 6 horas entre as tomadas, ou a critério do médico prescritor.

O tratamento com Tartarato do Ácido Gamaminoburítico + Ácido Glutâmico + Fosfato de Cálcio Dibásico + Nitrato de Tiamina + Cloridrato de Piridoxina + Cianocobalamina deverá durar até a melhora dos sintomas; todavia, esta duração poderá ser alterada a critério do médico prescritor.

Posologia e duração do tratamento com Tartarato do Ácido Gamaminoburítico + Ácido Glutâmico + Fosfato de Cálcio Dibásico + Nitrato de Tiamina + Cloridrato de Piridoxina + Cianocobalamina serão determinadas por prescrição médica. A dosagem máxima é a determinada pela posologia do produto, porém podendo ser alterada a critério do médico prescritor.

Doença renal

Um aumento da dose da vitamina B12 pode ser necessário em pacientes portadores de doença renal.

Diálise peritoneal / hemodiálise

Doses suplementares de piridoxina podem ser necessárias em pacientes sob diálise peritoneal ou hemodiálise.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Indicações do produto

dietas restritivas e inadequadas e/ou condições neurológicas com demanda metabólica potencialmente aumentada (doenças crônicas, convalescença e pacientes idosos).

Contra Indicações

O uso de Tartarato do Ácido Gamaminoburítico + Ácido Glutâmico + Fosfato de Cálcio Dibásico + Nitrato de Tiamina + Cloridrato de Piridoxina + Cianocobalamina deve ser evitado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um de seus componentes.

Tartarato do Ácido Gamaminoburítico + Ácido Glutâmico + Fosfato de Cálcio Dibásico + Nitrato de Tiamina + Cloridrato de Piridoxina + Cianocobalamina é contra-indicado em vigência de doença de Leber (atrofia óptica hereditária), devido à

Efeitos Colaterais

reações adversas com Tartarato do Ácido Gamaminoburítico + Ácido Glutâmico + Fosfato de Cálcio Dibásico + Nitrato de Tiamina + Cloridrato de Piridoxina + Cianocobalamina são eventos incomuns. Entretanto, podem ocorrer desconforto gastrointestinal, diarreia, neuropatia sensorial periférica ou sedação.

Em caso de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM