

Tiamina + Cloridrato de Piridoxina + Cianocobalamina

Posologia

Este medicamento deve ser administrado exclusivamente por via intramuscular profunda, de preferência nas nádegas.

Aplicar uma ampola por via intramuscular profunda a cada três dias. O limite diário de administração deste medicamento corresponde à posologia indicada ou poder ser alterado conforme prescrição médica.

Indicações do produto

Este medicamento é um auxiliar no tratamento de neuralgias e neurites.

Contra Indicações

Este medicamento não deve ser administrado a pacientes parkinsonianos em uso de levodopa isolada e a pessoas com reconhecida hipersensibilidade à tiamina ou a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para crianças.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento apresenta categoria de risco C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

Efeitos Colaterais

Reação comum ($> 1/100$ e $< 1/10$):

Coceira, diarreia.

Reação incomum ($> 1/1.000$ e $< 1/100$):

Dor de cabeça, náuseas, parestesia.

Reação rara ($> 1/10.000$ e $< 1/1.000$):

Reação anafilática. Esses fenômenos parecem estar mais relacionados à administração endovenosa de tiamina pura. A administração de tiamina associada a outras vitaminas do complexo B parece reduzir o risco dessas reações.

Em alguns pacientes podem ocorrer dor e irritação no local da aplicação de Cloridrato de Tiamina + Cloridrato de Piridoxina + Cianocobalamina.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM