

Tirotricina + Sulfato de Hidroxiquinolina

Posologia

gargarejos. Portanto, não deve ser ingerida.

Exclusivo Solução Pronta Para Uso

A solução Tirotricina + Sulfato de Hidroxiquinolina já está pronta para uso, não devendo ser diluída em água.

Exclusivo Solução Para Diluição

Atenção: Tirotricina + Sulfato de Hidroxiquinolina solução deve ser diluída em água antes de seu uso.

Posologia do Tirotricina + Sulfato de Hidroxiquinolina

Solução Pronta Para Uso

Adultos

Bochechar e/ou gargarejar o volume contido na tampa-medida, 3 a 4 vezes ao dia, ou de acordo com as instruções do dentista ou do médico. Nos quadros agudos, usar de 2 em 2 horas.

Crianças

Molhar uma haste flexível com ponta de algodão no produto e passar nas áreas afetadas da boca.

Para uma melhor ação do produto, é aconselhável não comer ou beber durante 30 minutos após o uso.

Uso em pacientes idosos

Não há recomendações especiais sobre o uso de Tirotricina + Sulfato de Hidroxiquinolina PPU por pacientes idosos.

Siga corretamente o modo de usar.

Solução Para Diluição

Adultos

Diluir 10 mL (um copinho-medida) de Tirotricina + Sulfato de Hidroxiquinolina (solução) em meio copo de água. Bochechar e/ou gargarejar 3 a 4 vezes ao dia, ou de acordo com as instruções do dentista ou do médico. Nos quadros agudos, usar de 2 em 2 horas.

Crianças

Molhar uma haste flexível com ponta de algodão no produto e passar nas áreas afetadas da boca.

Para uma melhor ação do produto, é aconselhável não comer ou beber durante 30 minutos após o uso.

Uso em pacientes idosos

Indicações do produto

Tirotricina + Sulfato de Hidroxiquinolina solução é destinado ao tratamento de dor de garganta, afecções da boca, aftas.

Contra Indicações

Tirotricina + Sulfato de Hidroxiquinolina solução não deve ser usada por pacientes que tenham alergia às substâncias ativas.

Tirotricina + Sulfato de Hidroxiquinolina não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Categoria de risco na gravidez: C.

Efeitos Colaterais

Até o momento, não foram registradas reações adversas graves com o uso de Tirotricina + Sulfato de Hidroxiquinolina solução.

Em caso de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA - disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM