

Posologia

Uso exclusivamente oftálmico.

Não deve ser injetado.

Pomada Oftálmica

Para evitar possível contaminação do frasco, não tocar a ponta da bisnaga em qualquer superfície. Nos casos leves a moderados, deve-se aplicar aproximadamente um centímetro da pomada no olho afetado 2 a 3 vezes por dia. Em infecções graves, deve-se aplicar um centímetro da pomada no olho a cada 3 ou 4 horas até obter melhora. A partir desse momento a frequência das aplicações deve ser reduzida antes de sua interrupção.

Solução Oftálmica

Para evitar possível contaminação do frasco, não se deve tocar a ponta do frasco em qualquer superfície. Nos casos leves a moderados, pingar uma ou duas gotas no olho afetado a cada 4 horas. Nos casos de infecções graves, pingar duas gotas no olho de hora em hora até melhorar e depois reduza a dose antes de interromper o tratamento.

Indicações do produto

bactérias sensíveis à Tobramicina.

Contra Indicações

Tobramicina é contraindicado para pessoas que tenham hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer excipiente.

Efeitos Colaterais

seguinte convenção:

Muito comum ($\geq 1/10$);

Comum ($\geq 1/100$ a $< 1/10$);

Incomum ($\geq 1/1.000$ a $< 1/100$);

Rara ($\geq 1/10.000$ a $< 1/1.000$);

Muito rara ($< 1/10.000$).

Dentro de cada grupo de frequência, as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade:

Classificação por sistema de órgãos

Frequência**Reações adversas**

Termo preferencial MedDRA (v. 15.1)

Distúrbio do sistema imune**Incomum**

Hipersensibilidade

Distúrbio do sistema nervoso**Incomum**

Dor de cabeça

Distúrbios oculares**Comum**

Desconforto ocular, hiperemia ocular

Incomum

Ceratite, abrasão da córnea, deficiência visual, visão turva, eritema palpebral, edema conjuntival, edema palpebral, dor nos olhos, olho seco, secreção ocular, prurido ocular, aumento do lacrimejamento

Distúrbios na pele e tecidos subcutâneos

08709.