

Posologia

Usando Triancinolona Acetonida

Se for necessário, assoe suavemente o nariz para limpar as narinas.

Preparando o frasco

Remova a tampa puxando para cima.

Agite o frasco. É importante agitar o frasco suavemente antes de cada uso.

Utilizando o frasco pela primeira vez

Segure o frasco na posição vertical.

Aponte o spray para longe de você enquanto faz isso.

Encha a bomba com spray pressionando o atuador para baixo.

Pressione e solte 5 vezes.

Faça isso até que uma suspensão fina seja produzida.

O spray está pronto para uso.

Utilizando o Spray

Tampe uma narina com o dedo.

Segure a garrafa na posição vertical e coloque a ponta do frasco na outra narina até onde for confortável.

Inspire suavemente pelo nariz com a boca fechada.

Enquanto você está fazendo isso, pressione o atuador para liberação do spray.

Em seguida, respire pela boca.

Repetir os passos 3 e 4 se tiver que voltar a pulverizar na mesma ou na outra narina.

Repita os itens 4, 5 e 6 conforme a posologia recomendada ou de acordo com a recomendação médica.

Evite assoar o nariz nos 15 minutos seguintes à administração.

Mantenha o frasco fechado com a tampa, enquanto não estiver em uso.

Após o uso

Limpe o atuador cuidadosamente com um lenço de papel ou pano limpo e recoloque a tampa e o grampo de segurança.

Indicações do produto

igual ou superior a 2 anos.

Contra Indicações

Triancinolona Acetonida é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente desta fórmula.

Efeitos Colaterais

Reação muito comum ($>1/10$);
Reação comum ($>1/100$ e $<1/10$);
Reação incomum ($>1/1.000$ e $<1/100$);
Reação rara ($>1/10.000$ e $<1/1.000$);
Reação muito rara ($<1/10.000$).

A incidência de reações adversas relatadas nos estudos clínicos com Triancinolona Acetonida suspensão nasal foi geralmente muito baixa e mais comumente envolvendo a mucosa nasal e da garganta.

As reações adversas mais frequentes em adultos e crianças com idade igual ou superior a 6 anos foram:

Distúrbio do Sistema Nervoso

Comum

Cefaleia.

Distúrbios Respiratórios, Torácicos e Mediastinal

Comum

Epistaxe, tosse, bronquite e dispepsia.

Infecções e Infestações

Comum

Rinite, faringite e sintomas de gripe.

Distúrbio Gastrointestinal

Comum

Desordens dentárias.

Reação adversa adicional em pacientes pediátricos

Foi observada uma redução na velocidade do crescimento em crianças durante estudo clínico pós-comercialização com Triancinolona Acetonida.

Reações adversas adicionais em crianças de 2 a 5 anos de idade

Distúrbios Respiratórios, Torácicos e Mediastinal

Comum

Dor faringolaríngea.

Distúrbio na pele e no tecido subcutâneo

Comum

DCB-Denominação Comum Brasileira

08856.