

Posologia

Não use em concentrações superiores a 0,5% em crianças pequenas.

Exclusivamente para uso oftálmico tópico. Não injetar.

Para evitar possível contaminação do frasco, mantenha a ponta do frasco longe do contato com qualquer superfície. Instilar 1 ou 2 gotas de Tropicamida.

Solução oftálmica. Decorridos 5 minutos, instilar mais 1 ou 2 gotas. Se o paciente não for atendido nos 20-30 minutos decorridos da primeira instilação, deve ser instilada uma gota adicional, a fim de prolongar os efeitos cicloplégico e midriático. Os pacientes com íris fortemente pigmentada podem precisar de doses maiores.

Midríase irá reverter espontaneamente com o decorrer do tempo, tipicamente em 4 a 8 horas. Entretanto, em alguns casos, a recuperação completa pode tomar até 24 horas.

Indicações do produto

Tropicamida solução oftálmica é indicado em procedimentos de diagnósticos como midriático e cicloplégico.

Contra Indicações

Este medicamento está contraindicado para pessoas que tenham hipersensibilidade ao princípio ativo ou qualquer excipiente da fórmula. Também está contraindicado em pacientes com glaucoma de ângulo da câmara anterior estreito ou com suspeita.

Efeitos Colaterais

estimadas a partir dos dados disponíveis. Dentro de cada classe de sistema de órgãos as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade.

Classificação por sistema de órgão

Termo preferido MedDRA (v. 12.1)

Distúrbios do sistema nervoso

Tontura, dor de cabeça

Distúrbios oculares

Visão turva, fotofobia, dor nos olhos, irritação nos olhos, hiperemia ocular

Distúrbios vasculares

Desmaio, hipotensão

Distúrbios gastrintestinais

Náusea

Distúrbios da pele e tecidos subcutâneos

Rash

Distúrbios gerais

Efeito prolongado do medicamento (midríase)

Medicamentos cicloplégicos podem aumentar a pressão intraocular e pode ocasionar glaucoma de ângulo fechado em pacientes predispostos.

Reações psicóticas e perturbações do comportamento têm sido relatadas com esta classe de medicamentos, especialmente em crianças.

DCB-Denominação Comum Brasileira

08978.