

Posologia

Uso oral. Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros e sem mastigar com quantidade suficiente de água para que sejam deglutidos.

Posologia do Vimpocetina

1 a 2 comprimidos 3 vezes ao dia, por no máximo 30 dias. A seguir, 1 comprimido 3 vezes ao dia.

Utilizar apenas a via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a oral, pode causar a perda do efeito esperado ou mesmo promover danos ao seu usuário.

A posologia recomendada de Vimpocetina pode ser ajustada, à critério médico, conforme a necessidade e o desenvolvimento do quadro clínico do paciente.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Indicações do produto

cerebrovasculares.

Contra Indicações

alcaloides da vinca, tais como vimblastina e vincristina; com insuficiência hepática e para pacientes que tiveram hemorragia cerebral recente ou hipertensão intracraniana.

Este medicamento é contraindicado para menores de 14 anos.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento apresenta categoria de risco B.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista

Efeitos Colaterais

O uso de Vimpocetina geralmente é bem tolerado nas doses recomendadas.

Porém, este medicamento pode causar as seguintes reações adversas:

Distúrbios Cardiovasculares:

Discreta redução na pressão arterial; taquicardia; aumento da excitabilidade ventricular (intervalo QT).

Distúrbios Cutâneos:

Rubor facial; prurido; parestesia; exantemas.

Distúrbios Gastrointestinais:

Desconforto gástrico; náusea; dispepsia; dores abdominais.

Distúrbios do Sistema Nervoso:

Vertigem; ansiedade; distúrbios do sono; cefaleia; nervosismo; angústia.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem