

## Vitamina E (Acetato de Racealfatocoferol)

### Posologia

Tomar 1 (uma) a 2 (duas) cápsulas ao dia, ou a critério médico.

Ingerir com um pouco de líquido, sem mastigá-las, durante, ou após a principal refeição do dia.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### Indicações do produto

Vitamina E (Acetato de Racealfatocoferol) é indicado; como antioxidante biológico; e na carência de Vitamina E (Acetato de Racealfatocoferol) devido a distúrbios da absorção (insuficiência pancreática exócrina, afecções hepato-biliares com colestase, atresia das vias biliares, redução da superfície de absorção intestinal).

### Contra Indicações

Vitamina E (Acetato de Racealfatocoferol) está contraindicado na presença de hipersensibilidade à Vitamina E (Acetato de Racealfatocoferol), ou a qualquer componente da formulação.

### Efeitos Colaterais

Até o momento, não foram observadas quaisquer reações adversas decorrentes do uso da Vitamina E (Acetato de Racealfatocoferol) dentro das quantidades correspondentes ao nível máximo de segurança. Contudo, quando doses acima das recomendadas são utilizadas, eventos adversos podem ocorrer.

Eventos adversos raros ( $> 1/10.000$  e  $< 1/1.000$ )

Sistema nervoso central  
Cefaleia; tontura.

Endócrino e metabólico  
Disfunção gonadal.

Gastrointestinal  
Diarreia; cólicas abdominais; náusea.

Sintomas gerais  
Fraqueza; fadiga; perda de energia.

Ocular  
Visão turva.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

### DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem